



Organization for angioedema
Bramerveld 53, 2151 LA, Nieuw-Vennep
+316 10517525
info@hae-qe.nl
KvK: 40413239

Il signora

ha un angioedema ereditario (deficit congenito di C1-inibitore). Il trattamento con il concentrato di C1-inibitore (Cynrize[®], 1000 U iv) o con icatibant (Firazyr[®], 30 mg per via sottocutanea) è urgentemente giustificato in caso di un attacco di angioedema. Il paziente può portare con sé questo trattamento (compreso il kit per la somministrazione endovenosa di questo farmaco (aghi, siringhe, ecc.))Può avere bisogno di aiuto per la somministrazione.

Se il concentrato non è facilmente disponibile, si può somministrare un altro concentrato di C1-inibitore (Conestat alfa/Ruconest[®] o Berinert[®]) o icatibant (Firazyr[®]) 30 mg per via sottocutanea che possono costituire un'alternativa. Se nessuno di questi prodotti è disponibile, il plasma (in grandi quantità, cioè 6 unità i.v.) può ridurre efficacemente l'attacco.

Gli steroidi e l'epinefrina non sono efficaci.



Organization for angioedema
Bramerveld 53, 2151 LA, Nieuw-Vennep
+316 10517525
info@hae-qe.nl
KvK: 40413239

Il signore

ha un angioedema ereditario (deficit congenito di C1-inibitore). Il trattamento con il concentrato di C1-inibitore (Cynrize[®], 1000 U iv) o con icatibant (Firazyr[®], 30 mg per via sottocutanea) è urgentemente giustificato in caso di un attacco di angioedema. Il paziente può portare con sé questo trattamento (compreso il kit per la somministrazione endovenosa di questo farmaco (aghi, siringhe, ecc.))Può avere bisogno di aiuto per la somministrazione.

Se il concentrato non è facilmente disponibile, si può somministrare un altro concentrato di C1-inibitore (Conestat alfa/Ruconest[®] o Berinert[®]) o icatibant (Firazyr[®]) 30 mg per via sottocutanea che possono costituire un'alternativa. Se nessuno di questi prodotti è disponibile, il plasma (in grandi quantità, cioè 6 unità i.v.) può ridurre efficacemente l'attacco.

Gli steroidi e l'epinefrina non sono efficaci.



Organization for angioedema
Bramerveld 53, 2151 LA, Nieuw-Vennep
+316 10517525
info@hae-qe.nl
KvK: 40413239

Il bambino

ha un angioedema ereditario (deficit congenito di C1-inibitore). Il trattamento con il concentrato di C1-inibitore (Cynrize[®], 1000 U iv) o con icatibant (Firazyr[®], 30 mg per via sottocutanea) è urgentemente giustificato in caso di un attacco di angioedema. Il paziente può portare con sé questo trattamento (compreso il kit per la somministrazione endovenosa di questo farmaco (aghi, siringhe, ecc.)Può avere bisogno di aiuto per la somministrazione.

Se il concentrato non è facilmente disponibile, si può somministrare un altro concentrato di C1-inibitore (Conestat alfa/Ruconest[®] o Berinert[®]) o icatibant (Firazyr[®]) 30 mg per via sottocutanea che possono costituire un'alternativa. Se nessuno di questi prodotti è disponibile, il plasma (in grandi quantità, cioè 6 unità i.v.) può ridurre efficacemente l'attacco.

Gli steroidi e l'epinefrina non sono efficaci.